

FÖREKOMSTEN AV MISTEL *Viscum album* I ASKÖVIKENS NATUR-  
RESERVAT 1986

---

Thomas Skoglund

I samband med att Västerås Ornitologiska Klubb inventerade den häckande fågelfaunan i Askövikens naturreservat 1985 och 1986, gavs tillfälle att även kartlägga förekomsten av mistel i området.

Efter att mer extensivt ha noterat mistelförekomster 1985 gjordes en noggrann uppföljning våren 1986. Samtliga påträffade mistlar noterades på karta och värdträdet artbestämdes. Anteckningarna gjordes i första hand av författaren och Martin Green.

Reservatet kan betraktas som välinventerat vad beträffar mistel och mycket få förekomster torde ha undgått inventerarna.

Samtliga mistlar i reservatet återfanns norr om viken. Inga mistlar har alltså anträffats på Solskär, vilket i sig kanske är anmärkningsvärt då misteltätheten på Tidöhalvön f ö är mycket hög.

Mistelförekomsterna är koncentrerade till framförallt två delområden; dels kring Fiskartorpet och dels kring Kvarntorpet och Knekttorpet. Endast ett mycket fåtal mistlar påträffades utanför dessa koncentrationer.

Se karta, bilaga 1, för redovisning av mistelförekomster 1986.

Det vanligaste värdträdet befanns vara hägg, följt av främst rönn, lönn och apel, se tabell 1.

Värdart	Antal parasiterade träd	Antal mistlar
<b>Populus tremula</b>	1	1
<b>Salix caprea</b>	1	1
<b>Malus sp.</b>	2	2+14=16
<b>Prunus padus</b>	7	1+1+1+2+2+6+9=22
<b>Sorbus aucuparia</b>	4	1+1+3+4=9
<b>Acer platanoides</b>	3	5+5+6=16
-----		
Σ	18	65
-----		

Tabell 1. Mistelförekomsten uppdelad på värdträdarter.

Ett fall av misteltäkt konstaterades ha skett i en apel  
strax väster om Sandtorpet någon gång mellan april 1985  
och april 1986. Där noterades en välväxt, samt två  
mindre mistlar 1985, men 1986 fanns endast de två mindre  
kvar. Där den större vuxit återfanns endast en kort,  
avbruten stump.



Thomas Skoglund



BILAGA 1